

# Die AIDS -Falle



## Lesen Sie das Kleingedruckte bei den HIV-Tests

### Rapid Test Beipackzettel:

"vorgesehen als patientennaher Labordiagnostik-Test zur **Unterstützung** der Diagnose einer HIV-Infektion." "Ein reaktives Ergebnis...**deutet** auf das Vorhandensein von **Antikörpern hin...**" (Mit anderen Worten, es ist nicht wirklich ein HIV-Test !)

### ELISA Antikörpertest Beipackzettel:

"Zur Zeit gibt es **keinen anerkannten Standard** zur Feststellung des Vorhandenseins von HIV-1 Antikörper im menschlichen Blut"

### Western Blot Antikörpertest Beipackzettel:

"Ein positives Ergebnis bei jeglichem Prüfmuster sollte mit **weiteren Testverfahren** validiert werden"

### PCR Gentest Beipackzettel:

"Nicht vorgesehen zum Einsatz als HIV-Screening-Test oder als **Diagnostetest** zur Bestätigung einer HIV-Infektion" (Der Test ist **nicht geeignet** zur Bestätigung des Vorhandenseins des Virus)

### bDNA Gentest Beipackzettel:

"Nicht gedacht als Screening-Test für HIV-Infektionen oder als diagnostischer Test zur Bestätigung einer HIV-Infektion." (Der Test ist **nicht geeignet** zur Bestätigung des Vorhandenseins des Virus)

**Es ist unglaublich**, aber die Tests testen nicht auf das Vorhandensein von HIV. Und Ärzte benutzen diese Tests weiterhin, um Menschen zu erzählen, dass Sie mit HIV "infiziert" seien und AIDS hätten oder bald bekommen würden..



## Aber, was genau messen Virologen und nennen es dann "HIV"?

In den Anfangsjahren von AIDS fanden Wissenschaftler hohe Konzentrationen von bestimmten Proteinen im Blut von AIDS-Opfern und nahmen an, diese seien Bestand-teile eines Virus, das die Krankheit auslöst. Die HIV-Tests werden auch heute noch basierend auf diesen Proteinen hergestellt. Wenn der Test eine stärkere Verfärbung zeigt, als ein willkürlich festgelegter Standard, dann werden Sie als 'HIV positiv' eingestuft.

### Aber gegen was 'positiv'?

Ähnliche Antikörper wie die im Test benutzten werden in Menschen gefunden, die schwanger waren oder sind, die bestimmte Impfungen bekamen (wie z.B. gegen Grippe, Hepatitis B oder Tetanus), die Bluttransfusionen bekamen, die längere Zeit drogenabhängig waren oder die Pilz- oder Virusinfektionen wie Herpes, Windpocken oder Masern hatten. Alle diese Faktoren (und viele anderen, etwa 70 sind bekannt) können zu einem positiven Testergebnis führen. In manchen Fällen testeten gesunde Menschen aus völlig ungeklärten Gründen positiv.

Wenn Sie positiv testen, müssen Sie die Frage stellen, warum. Ist es, weil Sie schwanger sind, eine Grippeimpfung bekommen haben, oder Masern haben oder einer der weiteren 70 möglichen Faktoren Sie positiv testen lässt, aber keine lebensgefährliche Bedrohung darstellt? Oder ist ihr Immunsystem beeinträchtigt und Sie müssen herausfinden, warum und was zu tun ist? Oder ist das Ergebnis in Ihrem Falle etwa völlig bedeutungslos?

## Die "Viral Load" PCR-Tests

Eine "PCR" genannte Technik ist in der Lage, kurze Sequenzen des genetischen Codes, die zu einem Virus gehören können, zu finden und zu multiplizieren.

Aber beweisen spezifische RNA-Ketten immer, dass ein Virus vorhanden ist? Wenn Forscher das Blut von AIDS-Patienten mit einer mittels PCR festgestellten "hohen Viruslast" unter dem Elektronenmikroskop untersuchten, konnten sie keine Viren finden.

*(Die Fotos und Zeichnungen, die Sie in der AIDS-Literatur und im Internet finden, zeigen allesamt Partikel unbekannter Herkunft und Funktion, die im Laborversuch erzeugt wurden.)*



## Wurden unschuldige RNA-Sequenzen "zusammengesetzt", damit ein Schuldiger am Tatort vorzuweisen ist?

Die "HIV" genannte Gensequenz kann von einem zum anderen Patienten um mehr als 20% variieren, eigentlich viel zu viel, um dabei noch von der gleichen Spezies zu sprechen. Es gibt sogar Berichte von HIV-Sequenzen in 'nicht HIV-infizierten' Menschen, Mäusen, Hunden, Rindern und selbst Würmern und Fliegen.

Virologen sagen, diese 'HIV-Genome' töteten unsere CD4 Immunzellen, aber sie können diese fehldefinierten Kennzeichen, die ihrer Meinung nach zu HIV gehören, in viel zu wenig CD4-Zellen finden, um eine ernste Schädigung zu erklären. Vielleicht erzeugen ja auch unsere Zellen diese Gensequenzen als Antwort auf eine Erkrankung im Rahmen einer Verteidigungsstrategie? Sind sie etwa dazu da, zu verteidigen anstatt anzugreifen? Oder sind sie nur Nebenprodukte einer Erkrankung?

### Es gibt noch mehr Probleme bei der HIV/AIDS-Theorie

Wissenschaftler haben Milliarden von Dollar in mehr als 60 verschiedenen Impfstoffversuchen ausgegeben, die alle erfolglos geblieben sind. Deuten alle diese Fehlschläge nicht viel mehr darauf hin, dass im Falle von AIDS kein spezifisches Retrovirus ursächlich beteiligt ist?

Die vorhergesagte AIDS-Pandemie in den 1990ern trat nie ein. Allgemein bekannt ist auch, dass in Afrika keine AIDS-Pandemie stattfand, denn die Bevölkerung dort hat sich seit dem Beginn von AIDS verdoppelt. Die Statistiken dort sind äußerst fehlerhaft. Wenn jemand dort an TB oder anderen gewöhnlichen Erkrankungen stirbt, wird er als AIDS-Toter deklariert, um so mehr Spenden und öffentliche Gelder für Medikamente zu erhalten.

AIDS ist noch nicht einmal überall das Gleiche. Die meisten in den USA diagnostizierten Fälle sind gesunde Menschen mit einem positiven HIV-Test und einer niedrigen Anzahl von CD4-Zellen. In Afrika wird nach der WHO-eigenen "Bangui-Definition" noch nicht einmal ein HIV-Test benötigt. Dort sind Fieber, Husten, Gewichtsverlust, Durchfall oder andere allgemeine Krankheitssymptome, Unterernährung oder parasitäre Infektionen für eine AIDS-Diagnose ausreichend.

# Die AIDS-Falle

## Wenn Sie denken, Sie könnten positiv sein...

...dann laufen Sie Gefahr, in die AIDS-Falle zu tappen.

Man wird Ihnen möglicherweise raten, sofort mit der Einnahme von antiretroviralen Medikamenten (ARV's) zu beginnen. Stopp! Warum war Ihr Test positiv? Trifft irgendeiner der 70 Faktoren, die ein positives Testergebnis verursachen können, auf Sie zu? Müssen Sie wegen einer akuten schweren Erkrankung oder Vergiftung behandelt werden? Vielleicht ist ein gesünderer Lebensstil alles, was ihnen fehlt. Oder vielleicht sind Sie ja auch vollkommen gesund. In manchen Fällen wie z.B. bei schweren Pilz- oder bakteriellen Infektionen bringen ARV's möglicherweise kurzzeitige Besserungen. Nicht weil sie Viren beeinflussen sondern weil sie Pilze und Bakterien abtöten (genauso wie die lebenswichtigen Mitochondrien in Ihren körpereigenen Zellen). Auf längere Zeit ist ihre Anwendung lebensgefährlich – die Haupttodesursache für Patienten in ARV-Behandlung ist Leberversagen, eine bekannte Nebenwirkung dieser Medikamente. AIDS-Medikamente können auch ernste Veränderungen Ihrer Körperperformen durch Fettverlust im Gesicht und an den Armen sowie die Ausbildung eines "Büffelhöckers" auf Ihrem Rücken verursachen. Eine erhöhte Gefahr von Herzinfällen sowie lebensgefährliche Anämien wurden bei etwa der Hälfte aller Patienten in ARV-Behandlung festgestellt.

Viele der Medikamente werden mit Nierenversagen und nervösen Störungen assoziiert, die so schwerwiegend sind, dass die Betroffenen ihren Namen nicht mehr schreiben oder nicht mehr gehen können. Wenn Sie schwanger sind wird man Sie zwingen, Medikamente einzunehmen, die das Wachstum Ihres Kindes beeinträchtigen, ja möglicherweise sogar zu Fehlbildungen und Krebs führen. Die Behörden werden damit drohen, Ihnen Ihr Kind wegzunehmen, wenn Sie ihm die Brust geben oder sich weigern, Ihrem Kind ähnliche Medikamente zu verabreichen.

Wenn Sie sexuell aktiv sind und mit einem Partner einvernehmlichen Sex hatten und dieser dann der Polizei gegenüber angibt, Sie hätten Ihren HIV-Status verschwiegen, dann drohen Ihnen Jahre hinter Gittern.

**Und all das nur, weil Sie diesen HIV-Test gemacht haben....**

# Die AIDS-Falle

## Verschenken Sie ihr Leben nicht aufgrund der AIDS-Hysterie

AIDS-Ärzte haben während der "AIDS-Hysterie"-Jahre 1987-97 unbeabsichtigt etwa 300000 Menschen umgebracht (durch die Verschreibung von hohen AZT-Dosen). Es war ein iatrogen (Arzt-induzierter) Massenmord und kostete unter anderem Arthur Ashe, Rudolph Nureyev, Rock Hudson, Kimberley Bergalis, Freddie Mercury und viele andere das Leben.

Sie waren gesund, bis man sie davon überzeugte, die Medikamente zu nehmen. Diese Gefahr besteht immer noch. Moderne AIDS-Medikamente sind zwar weniger giftig, aber in ihrer Wirkung insbesondere bei Langzeitanwendung immer noch lebensbedrohend. Auch heute (2009) noch sterben die Patienten in der modernen ARV-Therapie im Durchschnitt mit 45 Jahren.

## AIDS-Medikamente selbst können AIDS-Symptome erzeugen.

AIDS-Medikamente werden oft HIV-positiven Menschen verabreicht, die zu diesem Zeitpunkt keine Krankheits-symptome haben. Unter diesen Medikamenten entwickeln sie möglicherweise dann Symptome wie Gewichtsverlust, Übelkeit, Durchfall, psychische Störungen, Organversagen und so weiter. Dann erklären Ihnen die Ärzte: "Das HIV greift nicht nur Ihr Immunsystem an, sondern auch ihr Gehirn und ihr Nervensystem. Sie haben AIDS."

## Der Fall des Jim Malone

Das, was Ärzte HIV-positiven Menschen erzählen, erzeugt oft selbst ein extremes Trauma. Oft sind die Angst und Verzweiflung dieser Menschen ausreichend, um sie krank zu machen. Jim Malone aus San Francisco ist hierfür ein Beispiel. Im Jahre 1986 wurde ihm gesagt, er sei HIV-positiv und mit dem HIV-Virus infiziert. Daraufhin verlor Jim seinen Appetit und litt unter Schlaflosigkeit. In den nächsten 8 Jahren verlor er 20% seines normalen Gewichts. Sein Zustand verschlechterte sich immer mehr und er war schließlich auf häusliche Pflege angewiesen. Im Jahre 2003 wurde Jim erklärt, er habe AIDS im Endstadium. Im Jahre 2004 unterzog er sich einem erneuten HIV-Test und erhielt ein negatives Ergebnis. Sofort begannen Jims Gesundheits- und Schlafprobleme zu verschwinden. Heute geht es Jim gut.

## Ursachen und Behandlung von AIDS

Es wird oft gesagt, dass alle Forschungsergebnisse zeigten, dass AIDS von "HIV" verursacht wird. Aber eine falsche Aussage wird nicht durch ständiges Wiederholen zur Wahrheit. Fragen Sie einen AIDS-Experten oder Virologen nach den wissenschaftlichen Referenzen, die dies beweisen, dann werden diese Ihnen keine vorlegen können. Es ist interessant, dass in den wissenschaftlichen Fachjournalen nicht ein einziger Fall dokumentiert wurde, bei dem ein Angehöriger des medizinischen Fachpersonals durch einen Stich mit einer mit "HIV positivem" Blut verunreinigten Nadel mit AIDS infiziert wurde. Wenn AIDS wirklich ansteckend wäre, müsste dies eigentlich sehr häufig passieren.

Ihr Immunsystem kann durch Fehlernährung, Stress, giftige Drogen oder Medikamente oder selbst durch eine Bluttransfusion beschädigt werden. All dies erzeugt eine Situation von oxidativem Stress mit zu vielen schädlichen 'freien Radikalen'. Auch dies kann zu einem positiven HIV-Test führen.

Wenn Sie an einer der 'AIDS definierenden Krankheiten' leiden, können Sie eine direkte Behandlung dieser Krankheit verlangen. Sie brauchen keine antiretrovirale Behandlung gegen eine imaginäres, wissenschaftlich unbewiesenes Virus zu akzeptieren, von dem man Ihnen sagt, es sei in Ihrem Blut ohne dafür einen Beweis zu liefern.

## Ihre Krankheit gab es bereits lange bevor AIDS erfunden wurde

Ihr Immunsystem kann durch Behandlung mit Antioxidantien, Stressvermeidung oder die Vermeidung von Giften oder potenten Chemikalien (einschließlich Drogen und Medikamenten) wiederhergestellt werden. Sie können sich zwar nicht durch Sex mit AIDS infizieren, aber unbehandelte Geschlechtskrankheiten können Ihr Immunsystem schädigen. Die These, dass AIDS über HIV durch sexuelle Kontakte übertragen werden könne, ist falsch. Prostituierte sind nicht AIDS-gefährdet, so lange sie nicht drogenabhängig sind. HIV-negative Menschen werden selten positiv trotz jahrelangem ungeschützten Sexual-verkehr mit einem positiven Partner. Drogen- und Antibiotika-Missbrauch zusammen mit Sex kann hingegen sehr wohl ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen.

## Alive and well - Quicklebendig....

Die Wahrheit ist, dass Tausende von Menschen HIV-positiv getestet haben und sich gegen eine ARV-Therapie und für eine Behandlung der jeweiligen Erkrankung nach Symptomen entschieden haben. Es geht ihnen auch nach fünf, zehn, fünfzehn oder mehr als 20 Jahren gut. Fünfundzwanzig Jahre und Milliarden Ausgaben für Forschung haben uns keine Impfung und keine erfolgreiche Behandlung gebracht.

Tausende von Ärzten, Wissenschaftlern, Journalisten, Rechtsexperten und Erzieher sind nun der Meinung, dass die HIV/AIDS-Theorie überprüft werden muss. Viele haben festgestellt, dass nicht AIDS, sondern die HIV-Theorie die größte medizinische Tragödie des 20. Jahrhunderts ist. Für weitere Informationen und Referenzen zu den Informationen dieser Broschüre sowie zur Einsicht der Liste der weltweit über 2700 Experten, die das derzeitige HIV-Dogma in Frage stellen, besuchen Sie die Rethinking AIDS Webseiten: [www.rethinkingaids.com](http://www.rethinkingaids.com) oder [www.rethinkingaids.de](http://www.rethinkingaids.de)

Autor: Martin Barnes ([flatmartin@yahoo.com](mailto:flatmartin@yahoo.com))

Illustrationen von: R. Crumb

Deutsche Übersetzung: Stefan Risch

## Wie kann es sein, dass so viele Ärzte und Experten falsch liegen?

Als die 'AIDS-Epidemie' begann, gab es große Ängste in der Bevölkerung und einen immensen Druck, schnell eine medizinische Antwort zu finden. In unserem puritanischen Kulturkreis ("Sex ist verwerflich und schlecht.") wurde die Theorie der sexuellen Übertragbarkeit von AIDS durch das HI-Virus bereitwillig aufgenommen. Durch Bereitstellung von Geldern für HIV-Forschung und HIV-Medikamente entwickelte sich eine Eigendynamik. Als die HIV-Theorie von einigen Seiten kritisch hinterfragt wurde, erklärten Mediziner und Wissenschaftler diese voreilig per consensus zur Tatsache. Viele Mitarbeiter in der AIDS-Industrie hatten auf der unbewiesenen Hypothese ihre Karrieren aufgebaut. Sie waren nicht mehr in der Lage, den Fehler zu sehen. Und wenn sie ihn sahen, waren sie dem übermächtigen Gebilde aus Glaube und öffentlichen Vorsorgeparolen gegenüber machtlos.

Die AIDS-Experten waren im Laufe der Zeit gezwungen, die Zeitspanne zwischen Infektion und Ausbruch der Krankheit in unbehandelten Menschen ständig zu verlängern. Sie liegt heute bei 20 Jahren – also fast der gesamten Zeitdauer der Epidemie!

## Warum wird die fehlerhafte AIDS-Theorie aufrechterhalten?

'AIDStruth', eine von Behörden und der Pharmaindustrie unterstützte aggressive Gruppe, stempelt alle Kritiker des 'HIV=AIDS'-Dogmas als sogenannte "Leugner" ab. Sie behauptet, unsere kritischen und hinterfragenden Informationen seien "gefährlich" und eine "Bedrohung für die öffentliche Gesundheit".

Ärzte, Wissenschaftler und Journalisten, die auf die Unzulänglichkeiten des HIV-Tests, auf die Unwirksamkeit und Gefährlichkeit der AIDS-Medikamente oder auf das Fehlen des wissenschaftlichen Nachweises für den kausalen Zusammenhang zwischen HIV und AIDS hinweisen, werden sofort scharf attackiert und geächtet. Da hineingezogen zu werden, kann den Respekt der Kollegen, Karriere sowie Status und Einkommen kosten. Viele, die auf diese Art abgestraft worden sind, flüchten sich zurück in den Konsens.

Wissenschaftler und insbesondere Ärzte leben oft in einer Art Kokon – sie ziehen es vor, sich auf Informationen ihrer Autoritäten zu verlassen und keine kritischen Fragen zu stellen.

Diese Broschüre wurde vom Rethinking AIDS Board genehmigt, einer Vereinigung für die wissenschaftliche Neubewertung der HIV/AIDS-Hypothese.

# Die AIDS-Falle



Ein positives HIV-Testergebnis wird ihr Leben für immer verändern. Sie können Ihre Freunde verlieren, Ihre Partnerschaften, Ihre Krankenversicherung, Ihren Job oder das Sorgerecht für Ihre Kinder. Sogar Ihren Verstand. Wir möchten Sie mit ein paar Fakten vertraut machen, bevor Sie einen HIV-Test durchführen lassen. Fakten, von denen Ärzte und medizinisches Fachpersonal Ihnen möglicherweise nichts erzählen. Ein positives Testergebnis bedeutet nicht, dass Sie mit einem tödlichen Virus infiziert sind. Es kann von nicht gesundheitsgefährdenden Faktoren ausgelöst werden oder eine Warnung sein, dass Ihr Immunsystem angeschlagen ist. Wenn Sie krank sind, benötigen Sie nicht zwangsläufig Medikamente, um wieder gesund zu werden, insbesondere nicht die gefährlichen AIDS-Medikamente